

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 02	วันที่บังคับใช้ 28/2/2564	หน้า 1/1	สำเนาที่
วิธีปฏิบัติที่: WI-EMR-01.09		เรื่อง: การใส่สาย ICD		

วิธีปฏิบัติ

1. เตรียมอุปกรณ์

- เตรียม set ICD , ขวด 2 ขวด 3 ขวด , สายต่อ , โหมเบอ์ 0, เข็มcutting ,ยาชาเฉพาะที่
- เตรียมทำผู้ป่วยให้สะดวกในการทำหัตถการและไม่เกิดอันตรายกับผู้ป่วย
- ช่วยแพทย์ทำหัตถการ

2. ประเมินสภาพผู้ป่วย ขณะใส่ท่อระบายทรวงอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ

- unrecognized diaphragmatic hernia
- ใส่ท่อระบายทรวงอกในชั้น subcutaneous tissue

หลังทำหัตถการและลงบันทึกให้ถูกต้อง

-สังเกตภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยขณะทำ ได้แก่

- Hemothorax จากการฉีกขาดของ intercostals vessels
- Lung laceration จากภาวะที่มีพังผืดในช่องเยื่อหุ้มปอด
- Diaphragm/abdominal cavity penetration จากการใส่ต่ำเกินไป
- Stomach/colon injury from ทำให้มีอาการปวด หรือมีการหักงอของท่อ
- ท่อระบายทรวงอกหลุด เนื่องจากเย็บผูกไม่แน่น

-สังเกตภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลังทำ ได้แก่

- ท่อระบายทรวงอกอุดตัน จากลิ่มเลือด, fibrinous exudates
- Retained/ clotted hemothorax
- Empyema
- Pneumothorax after removal

3 ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังทำหัตถการได้ถูกต้อง

4 เก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้ครบและลงบันทึกผลการปฏิบัติ

5 เขียนใบส่งตรวจได้ถูกต้องตามชนิดของวัตถุส่งตรวจ

6 ตรวจและติดตามผล พร้อมลงบันทึกทางการแพทย์

ผู้จัดทำ..... หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และนิติเวช28/2/2564..... วันที่
ผู้อนุมัติ..... หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล28/2/2564..... วันที่
สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....	