

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่: 05	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 1/5	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD-03.09	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา			

1.0 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อให้พยาบาลผู้ป่วยใน ใช้เป็นแนวทางในการพ่นยาแก่ผู้ป่วย
เป้าหมาย เพื่อให้การพ่นยาแก่ผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

2.0 นโยบาย

โรงพยาบาลชุมชนมีแนวทาง ในการพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาล
จากทีมการพยาบาล ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ ผู้ป่วยได้รับการพ่นยาอย่างมีคุณภาพ

3.0 ขอบเขต

เริ่มตั้งแต่มีคำสั่งการรักษาให้พ่นยาแก่ผู้ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการพ่นยา โดยมีการเฝ้าระวังอย่างมี
คุณภาพ

4.0 ความรับผิดชอบ

4.1 แพทย์ผู้รักษา

ตรวจประเมินและสั่งการรักษา

4.2 พยาบาลผู้ป่วยใน

ดำเนินการพ่นยาแก่ผู้ป่วย ตามแผนการรักษาของแพทย์

5.0 คำจำกัดความ

5.1 พยาบาลผู้ป่วยใน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ประจำตึกผู้ป่วยชาย,ตึกผู้ป่วยหญิง,ตึกผู้ป่วยเด็ก,
ตึกผู้ป่วยหนัก,ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม

6.0 วิธีปฏิบัติ

การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา

1. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR

2. ปิด Mask

3. เตรียมชุดพ่นยา

3.1 ชุดพ่นยา 1 ชุด

3.2 เกย์ออกซิเจน

3.3 joint ต่อเกย์ออกซิเจน

4. แจ้งผู้ป่วยทราบ กรณีผู้ป่วยหลับปลุกผู้ป่วยให้ตื่น ป้องกัน Aspirate

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่: 05	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 2/5	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD-03.09	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา			

5. ต่อเกลียวออกซิเจนเข้ากับ pipe line ต่อ joint กับเกลียวออกซิเจน
6. เช็ด joint ด้วย 70 % Alcohol
7. ถอดส่วนที่เป็นหน้ากากพ่นยาออก
8. เติมน้ำยาพ่น + NSS ตามแผนการรักษา
9. เปิดออกซิเจน โดยหมุนเกลียวออกซิเจนไปที่ 8-10 L/m เพื่อให้เกิดควัน
10. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
11. ปิดเกลียวออกซิเจน เมื่อพ่นจนควันหมด
12. เก็บ Mask ไว้ในถุงพลาสติก/กล่องพลาสติก
13. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
14. บันทึกการให้การพยาบาล ขณะพ่นยา , หายใจ , S/E ของยา

หมายเหตุ - Mask ใช้ 1 วัน / คน เปลี่ยนทุกเวอร์ตีก
 - น้ำยาใช้พ่นที่เตรียมใส่ Syringe ใช้ได้ 1ชุด/ 8 ชม. (ได้แก่ NSS,Ventolin, Berodual)
 - NSS ใช้พ่นยา ครบเปลี่ยน24 ชม.

7.0 เอกสารแนบ

- แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการพ่นยา

8.0 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ

- อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อจากการพ่นยา = 0 ครั้ง

9.0 เอกสารอ้างอิง

—

10.0 แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการพ่นยา

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

คำจำกัดความ (Definition) การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของพยาบาลผู้ป่วยในในการพ่นยาให้กับผู้ป่วย

รายการ	Knowledge	Attitude	Skill
การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา			√

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่: 05	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 3/5	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD-03.09	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา			

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติ = 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติ = 0 คะแนน
 พยาบาลผู้ป่วยในต้องปฏิบัติครบทุกข้อ คิดเป็น 100 % จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

- ☐ ผ่านการประเมิน
☐ โอกาสพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

- ☐ ศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม
☐ ฝึกประสบการณ์กับผู้ชำนาญการ
☐ ประเมินซ้ำอีก 1 เดือน
☐ อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน



วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน.....

แบบประเมินสมรรถนะทีมการพยาบาล เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่: 05	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 4/5	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD-03.09		เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา		

ข้อรายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา		
1. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
2. ปิด Mask
3. เตรียมชุดพ่นยา
3.1 ชุดพ่นยา 1 ชุด
3.2 เกยออกซิเจน
3.3 joint ต่อเกยออกซิเจน
4. แจ้งผู้ป่วยทราบ กรณีผู้ป่วยหลับปลุกผู้ป่วยให้ตื่น ป้องกัน Aspirate
5. ต่อเกยออกซิเจนเข้ากับ pipe line ต่อ joint กับเกยออกซิเจน
6. เช็ด joint ด้วย 70 % Alcohol
7. ถอดส่วนที่เป็นหน้ากากพ่นยาออก
8. เติมน้ำยาพ่น + NSS ตามแผนการรักษา
9. เปิดออกซิเจน โดยหมุนเกยออกซิเจนไปที่ 8-10 L/m เพื่อให้เกิดควัน
10. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
11. ปิดเกยออกซิเจน เมื่อพ่นจนครบวันหมด
12. เก็บ Mask ไว้ในถุงพลาสติก/กล่องพลาสติก
13. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
14. บันทึกการให้การพยาบาล ขณะพ่นยา , หายใจ , S/E ของยา
หมายเหตุ		
- Mask ใช้ 1 วัน / คน เปลี่ยนทุกเวรตึก
- น้ำยาใช้พ่นที่เตรียมใส่ Syringe ใช้ได้ 1ชุด/ 8 ชม. (ได้แก่ NSS,Ventolin, Berodual)
- NSS ใช้พ่นยา ครบเปลี่ยน 24 ชม.

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่: 05	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 5/5	สำเนาที่ :
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD-03.09	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา			

<p>ผู้จัดทำ.....</p> <p>หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน</p>		<p>.....05/01/64.....</p> <p>วันที่</p>
<p>ผู้อนุมัติ ...</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล</p>		<p>.....05/01/64.....</p> <p>วันที่</p>
<p>สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....</p>		