

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 1/5	สำเนาที่:
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD2-03	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพญา Nebulizer Continuous			

1.0 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อให้พยาบาลผู้ป่วยในเด็กใช้เป็นแนวทางในการพญา Nebulizer Continuous แก่ผู้ป่วย

เป้าหมาย เพื่อให้การพญาแก่ผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2.0 นโยบาย

ทีมการพยาบาล ผู้ป่วยในเด็กโรงพยาบาลชุมชนมี แนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล จากทีมการพยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

3.0 ขอบเขต

เริ่มตั้งแต่มีคำสั่งการรักษาให้พญา Nebulizer Continuous แก่ผู้ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการพญา Nebulizer Continuous ต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

4.0 ความรับผิดชอบ

4.1 แพทย์ผู้รักษา

ตรวจประเมินอาการผู้ป่วยและสั่งการรักษา

4.2 ทีมการพยาบาลผู้ป่วยใน

ดำเนินการพญา Nebulizer Continuous แก่ผู้ป่วย ตามแผนการรักษาของแพทย์

5.0 คำจำกัดความ

ทีมการพยาบาลผู้ป่วยใน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพตึกผู้ป่วยในเด็ก, พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำตึก

6.0 วิธีปฏิบัติ

1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์
2. แจ้งผู้ป่วยและญาติทราบถึงความจำเป็นในการใช้ยาพญาต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ชั่วโมง เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนให้การพญา Nebulizer Continuous
3. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
4. ปิด Mask
5. เตรียมชุดพญา
 - 5.1 ชุดพญา 1 ชุด ประกอบด้วย mask สาย calugate กระจกใส่เติมน้ำยา Ventolin solution และ NSS
 - 5.2 เกยออกซิเจน
 - 5.3 joint ต่อเกยออกซิเจน
6. ต่อเกยออกซิเจนเข้ากับ pipe line เช็ด joint ด้วย 70 % Alcohol ต่อ joint กับเกยออกซิเจน
7. เติมน้ำยา Ventolin solution และผสมใน NSS ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
8. ครอบ mask ให้พอดีกับจมูกผู้ป่วย
9. เปิดออกซิเจน โดยหมุนเกยออกซิเจนไปที่ 10 L/m เพื่อให้เกิดควัน
10. พญา Nebulizer Continuous ต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงหรือจนกว่าน้ำยาหมดโดยมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยให้ ปลอดภัย
11. ปิดเกยออกซิเจน

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 2/5	สำเนาที่: 1
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD2-03	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา Nebulizer Continuous			

12. เก็บ set พ่นยาส่งห้องฆ่าเชื้อ
13. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
14. ประเมินอาการและบันทึกการพยาบาลขณะพ่นยา Nebulizer Continuous และหลังพ่นยา

7.0 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ

- อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อ = 0 ครั้ง

8.0 เอกสารอ้างอิง

–

9.0 เอกสารแนบ

- แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการพ่นยา Nebulizer Continuous

แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการพ่นยา Nebulizer Continuous

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

คำจำกัดความ (Definition) การประเมินสมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะของทีมนักพยาบาลผู้ป่วยในเด็กในการพ่นยา Nebulizer Continuous ให้กับผู้ป่วย

รายการ	Knowledge	Attitude	Skill
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยการพ่นยา Nebulizer Continuous			✓

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 3/5	สำเนาที่: 1
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD2-03		เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยา Nebulizer Continuous		

เกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติ = 1 คะแนน ไม่ปฏิบัติ = 0 คะแนน

พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยในต้องปฏิบัติตามทุกข้อ คิดเป็น 100 % จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

- ผ่านการประเมิน
- โอกาสพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

- ศึกษาข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม
- ฝึกประสบการณ์กับผู้ชำนาญการ
- ประเมินซ้ำอีก 1 เดือน
- อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน.....


แบบประเมินสมรรถนะที่การพยาบาล เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยการพ่นยา Nebulizer Continuous

ข้อรายการ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติการพ่นยา Nebulizer Continuous		
1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์
2. แจ้งผู้ป่วยและญาติทราบถึงความจำเป็นในการใช้ยาพ่นต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ชั่วโมง เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนให้การพ่นยา Nebulizer Continuous
3. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
4. ปิด Mask
5. เตรียมชุดพ่นยา		
5.1 ชุดพ่นยา 1 ชุด ประกอบด้วย mask สาย calugate กระปุกใส่เติมน้ำยา Ventolin solution และ NSS
5.2 เกยออกซิเจน

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 4/5	สำเนาที่: 1
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD2-03	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพญา Nebulizer Continuous			

5.3 joint ต่อเกยออกซิเจน
6. ต่อเกยออกซิเจนเข้ากับ pipe line เช็ด joint ด้วย 70 % Alcohol ต่อ joint กับเกยออกซิเจน
7. เติมน้ำยา Ventolin solution และผสมใน NSS ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
8. ครอบ mask ให้พอดีกับจมูกผู้ป่วย
9. เปิดออกซิเจน โดยหมุนเกยออกซิเจนไปที่ 10 L/m เพื่อให้เกิดควัน
10. พญา Nebulizer Continuousต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงหรือจนกว่าน้ำยาหมดโดยมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยให้ปลอดภัย
11. ปิดเกยออกซิเจน
12. เก็บ set พญาส่งนึ่งฆ่าเชื้อ
13. ล้างมือแบบ Hygiene Hand Wash หรือใช้ AHR
14. ประเมินอาการและ บันทึกการพยาบาลขณะพญา Nebulizer Continuous และหลังพญา
14. ประเมินอาการและบันทึกการพยาบาลเมื่อพญา Nebulizer Continuous

โรงพยาบาลชุมชน	ฉบับที่: A แก้ไขครั้งที่ 01	วันที่ประกาศใช้: 05/01/64	หน้า: 5/5	สำเนาที่: 1
วิธีปฏิบัติที่: WI-IPD2-03	เรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยพญา Nebulizer Continuous			

ผู้จัดทำ04/01/64.....
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในเด็ก	วันที่
	
ผู้อนุมัติ04/01/64.....
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	วันที่
สถานะเอกสารเอกสารควบคุม.....	